

CROCODILE Ertragsspitze mit Kohlhernieresistenz



| Ertrag | Kornertrag | hoch – sehr hoch 8 | |
|-----------------|---|---|--|
| | Ölertrag | hoch 7 | |
| | Ölgehalt | hoch 7 | |
| Gesundheit | | <i>durchschnittlich</i> | <i>hoch</i> |
| | Phoma | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Cylindrosporium | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Verticillium | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | TuYV | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Kohlhernie | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Bei Starkbefall mit Blattphoma im Herbst mit Fungiziden unterstützen. | | |
| Standort | | <i>mittel</i> | <i>gut geeignet</i> |
| | Leichte Standorte (z. B. Sand, lehmiger Sand) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Gute Standorte (z. B. Löss & V, Lehm, Hügelland) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Schwierige Standorte (z. B. Marschen, Höhenlagen, Ton) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Anbau und Ernte | Saattermin | früh <input checked="" type="checkbox"/> | spät <input type="checkbox"/> |
| | Herbstentwicklung | verhalten <input checked="" type="checkbox"/> | wüchsig <input type="checkbox"/> |
| | Wachstumsstart Frühjahr | früh <input type="checkbox"/> | spät <input type="checkbox"/> |
| | Winterhärte | gering <input type="checkbox"/> | hoch <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Standfestigkeit | gering <input type="checkbox"/> | hoch <input type="checkbox"/> |
| | Druschtermin | früh <input checked="" type="checkbox"/> | spät <input type="checkbox"/> |
| | Druschkraftbedarf | gering <input type="checkbox"/> | hoch <input type="checkbox"/> |
| | Geduldiger Wuchstyp | | |

- Mehrjährig stabile Praxiserträge.
- Umweltstabil.
- Saatzeitflexibel, auch für frühe Saaten.

